

Секция «Психология»

Особенности психосоматических расстройств при синдроме Кувад Шевелева Анна Евгеньевна

Студент

Коми филиал Кировской Государственной медицинской академии, Лечебное дело,

Сыктывкар, Россия

E-mail: shevel-ananya@yandex.ru

Президентом РФ был утвержден проект «Концепция демографической политики на период до 2025 года». По итогам выборочного обследования программы "Семья и рождаемость" 2010 г., очень незначительная часть мужчин были готовы активно принять участие в процессе подготовки к родам. Только 11,6% женщин отметили, что отец помогал или будет помогать в процессе родов. Мужчины оценивали период беременности жены эмоционально как крайне напряженный [1]. Мужчины, имеющие беременных жен, подвержены синдрому Кувад. При этом синдроме будущий отец испытывает те же неприятные ощущения, переживания и сенсации, что и его беременная жена [2].

Цель исследования: оценить распространность и социально-эпидемиологические особенности синдрома Кувад у мужчин Республики Коми. Опрошено 78 беременных женщин в возрасте от 17 до 41 года в сроке беременности от 31 до 41 недели. Они оценивали состояние своих партнеров, а также отвечали на вопросы об их социально-личностном статусе. Оценивалось влияние социальных факторов и личностных характеристик на возникновение отдельных психосоматических симптомов: увеличение веса, тошнота, рвота, спазмы в животе, извращение аппетита, нарушение сна, головные боли, боли в области поясницы. Результаты. На первом месте выявлены нарушение сна – 12,82%, головные боли – 7,69%, увеличение веса – 6,41%, в единичных случаях встречаются – запор/понос, боли в области поясницы по 2,6%, тошнота /рвота, спазмы в животе по 1,3%. Отцы с высшим образованием чаще предъявляли жалобы ($p=0,03$); у мужчин выросших в неполной семье выявлено большее количество симптомов ($p\leq0,05$), у них же чаще встречалась тянущая боль в области поясницы ($p=0,003$). Мужья имевшие жен с большим количеством соматических жалоб чаще испытывали те же психосоматические симптомы ($p\leq0,01$). Большее число жалоб выявлено в группе с планированной беременностью ($p\leq0,05$); в группе, где жена стала более внимательной к отцу ребенка ($p\leq0,001$), и где муж стал более заботливым ($p\leq0,01$). Зависимости от возраста мужчины числа родов и места жительства не выявлено.

Выводы: выраженност синдрома Кувад снижает желанность следующей беременности.

Литература

1. Демографические исследования: — Санкт-Петербург, КДУ, 2009 г.- 292 с.
2. Марилов В.В. Синдром Кувад //Журнал неврологии и психиатрии С.С. Корсакова.- 1997-12